

Durée : 2 heure

Toute calculatrice autorisée

– Exercice 1 – (3 points)

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points :

$$A(-2;3), \quad B(3;4), \quad \text{et} \quad C(7;3).$$

1. Calculer les coordonnées des points D, E, F, G définis de la façon suivante :
 - D est l'image de A par la translation de vecteur $\vec{u}(6; -2)$;
 - $ADBE$ est un parallélogramme;
 - F est le symétrique de C par rapport à A ;
 - G est le symétrique de B par rapport au milieu de $[AD]$.
2. Les points B, C et E sont-ils alignés ? (Justifier la réponse par un calcul.)
3. Démontrer que $CEFG$ est un parallélogramme.

– Exercice 2 – (4 points)

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$; $E, F, G,$ et H sont les milieux respectifs de $[AD], [DB], [AC]$ et $[BC]$.

1. Démontrer que $\vec{EG} = \vec{FH}$.
2. Démontrer que $\vec{FG} = \frac{1}{2}(\vec{DC} - \vec{AB})$.
3. Démontrer que $\vec{EH} = \frac{1}{2}(\vec{DC} + \vec{AB})$.
4. Démontrer que les points E, G, H et F sont alignés.

– Exercice 3 – (6 points)

Soit f la fonction définie pour tout réel $x \neq -2$ par $f(x) = 1 - \frac{6}{x+2}$. On note C_f sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé.

1. Calculer les coordonnées des points d'intersection de la courbe C_f avec les axes du repère.

2. a. Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $]-2; +\infty[$
- b. On admet que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $]-\infty; -2[$. Donner le tableau de variations de la fonction f .
3. Soit g la fonction affine telle que $g(-1) = -3$ et $g(3) = 1$.
Déterminer l'expression de $g(x)$ en fonction de x .
4. a. Montrer pour tout réel $x \neq -2$, $f(x) - g(x) = \frac{x - x^2}{x + 2}$.
- b. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq g(x)$.


- Exercice 4 - (7 points)

$ABCD$ est un carré de côté 4, M un point de la diagonale $[BD]$ et H le projeté orthogonal de M sur $[BC]$.

On pose $BH = x$.

Le but de cet exercice est de déterminer pour quelle valeur de x le trapèze $ABHM$ et le triangle DMC ont la même aire.

Rappel : l'aire d'un trapèze de grande base \mathcal{B} , de petite base b et de hauteur h est donnée par : $\mathcal{S} = \frac{1}{2}(\mathcal{B} + b)h$.



Partie A : Traduction mathématique des données

1. a. À quel intervalle I appartient x ?
- b. Démontrer que $HM = x$.
2. a. On note $\mathcal{S}(x)$ l'aire du trapèze $ABHM$. Démontrer que $\mathcal{S}(x) = \frac{1}{2}x(x + 4)$.
- b. On note $\mathcal{A}(x)$ l'aire du triangle DMC . Démontrer que $\mathcal{A}(x) = 2(4 - x)$.

Partie B : Étude des fonctions en jeu

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \frac{1}{2}x(x+4)$ et g la fonction définie sur \mathbb{R} par $g(x) = 2(4 - x)$.

1. Étude de f
 - {(a)}
 - a. Démontrer que $f(x) = \frac{1}{2}(x+2)^2 - 2$.
 - b. Démontrer que la fonction f admet un minimum en $x = -2$.
 - c. Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty; -2]$ puis sur l'intervalle $[-2; +\infty[$, par la méthode de votre choix.
Dresser le tableau de variation de f sur \mathbb{R} et retrouver alors le résultat du 1.(b).
 - d. Faire un tableau de valeurs de pas 0,2 pour la fonction f sur l'intervalle $[-3; -2]$.

2. Étude de g

La fonction g est de quel type ? Quel est son sens de variation ? Justifier.

3. Tracé des courbes

Page suivante, on a tracé la courbe représentative \mathcal{C}_f de la fonction f dans un repère ortho-normal. Dans le même repère, :

- tracer la courbe représentative \mathcal{C}_g de la fonction g ;
- faire apparaître la courbe représentative $\mathcal{C}_\mathcal{S}$ de la fonction \mathcal{S} , définie sur l'intervalle I ;
- faire apparaître la courbe représentative $\mathcal{C}_\mathcal{A}$ de la fonction \mathcal{A} , définie sur l'intervalle I .

On utilisera des couleurs différentes pour faciliter la visualisation des différentes courbes.

Partie C : Résolution du problème

On se propose de déterminer finalement la valeur de x pour laquelle $\mathcal{S}(x) = \mathcal{A}(x)$.

1. Résolution graphique

En utilisant les courbes représentatives de \mathcal{S} et \mathcal{A} de la partie précédente, déterminer graphiquement une valeur approchée de la valeur de x pour laquelle $\mathcal{S}(x) = \mathcal{A}(x)$. Expliquer.

2. Résolution algébrique

Démontrer que $\mathcal{S}(x) = \mathcal{A}(x)$ équivaut à $(x+4)^2 = 32$.

En déduire la valeur exacte de x pour laquelle le trapèze $ABHM$ et le triangle DMC ont la même aire.

Courbe représentative de f

